



โรงพยาบาลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน / วิธีการทำงาน /แนวทางเวชปฏิบัติ

ประเภทเอกสาร	วิธีปฏิบัติงาน	
ชื่อเอกสาร	การป้องกันผู้ป่วยล้มขณะเอกซเรย์	
รหัสเอกสาร	WI-RAD-๐๑๓	
แผนกที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
วันที่ประกาศใช้	๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	
ผู้จัดทำ	กลุ่มงานรังสีวิทยา	(นายธนากร จันทร์ยานนท์) หน่วยงาน กลุ่มงานรังสีวิทยา
ผู้ทบทวน	ประธานคณะกรรมการจัดทำ คู่มือการบริการ	(นางสาวศรสวรรค์ นุ่มมีศรี)
อนุมัติโดย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า	(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ฉบับทบทวนครั้งที่ ๐๑

จำนวน ๑ หน้า

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า ๑/๑
วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ : WI-RAD-๐๑๓	ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ : ๑
เรื่อง : การป้องกันผู้ป่วยล้มขณะเอกซเรย์	วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
แผนก : กลุ่มงานรังสีวิทยา	แผนกที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
ผู้จัดทำ : นายธนากร จันทร์ยานนท์	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

วิธีปฏิบัติงาน : การป้องกันผู้ป่วยล้มขณะเอกซเรย์

๑. วัตถุประสงค์ (Objectives) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันผู้ป่วยล้มขณะทำการเอกซเรย์

๒. ขอบเขต (Scope) ครอบคลุมผู้ป่วยที่มารับบริการถ่ายภาพรังสีที่กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก

๓. คำจำกัดความ (Definition)

หกล้ม คือ ล้มลงเพราะสะดุดหรือเสียการทรงตัว

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ ต้องประเมินอาการและคอยดูผู้ป่วยตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในห้องเอกซเรย์

พนักงานเปล ช่วยพาผู้ป่วยไปห้องฉุกเฉินอย่างถูกวิธี

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

๑. ผู้ป่วยที่ยืนไม่ค่อยไหว ที่เสี่ยงต่อการล้ม แล้วแพทย์ส่งมาเอกซเรย์ในท่า Upright ให้เอกซเรย์ในท่านั่งแทน

๒. ผู้ป่วยที่เป็นเด็ก, คนเมาให้ ญาติหรือเจ้าหน้าที่ คอยช่วยจับผู้ป่วยในขณะที่เอกซเรย์ และเตรียมพร้อมหากเกิดภาวะฉุกเฉิน

๓. ในขณะที่ขึ้นเปลผู้ป่วยเข้าห้องเอกซเรย์ ควรทำด้วยความนุ่มนวลและระมัดระวัง

๔. ในกรณีที่ผู้ป่วยมาด้วยรถเข็นนั่ง หากต้องการถ่ายภาพเอกซเรย์ในท่ายืน ให้สอบถามผู้ป่วยว่าสามารถยืนได้หรือไม่ หากยืนได้ให้เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อม ก่อนให้ผู้ป่วยยืนเพื่อให้ผู้ป่วยยืนให้น้อยที่สุด เตรียมรถเข็นนั่งไว้ด้านหลังผู้ป่วยและให้ญาติหรือเจ้าหน้าที่ คอยช่วยจับผู้ป่วยในขณะที่เอกซเรย์ และให้ผู้ป่วยนั่งรถเข็นนั่งหากผู้ป่วยยืนไม่ไหว

แนวทางแก้ไขเมื่อผู้ป่วยตกจากรถนอนหรือจากเตียงเอกซเรย์

๑. เจ้าหน้าที่ห้องเอกซเรย์ช่วยเหลือผู้ป่วยให้นอนอยู่นิ่งๆ

๒. แจ้งพนักงานเปลมาช่วยเหลือผู้ป่วยขึ้นรถเข็นนอน

๓. นำส่งผู้ป่วยไปห้องฉุกเฉินเพื่อให้แพทย์ตรวจอาการ

๔. มีการทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางป้องกัน